



# 1. simpozij Perović – Krmpotić Nemanić

Knjiga sažetaka

Zavod za anatomiju “Drago Perović”  
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
18. siječnja 2019.

Knjiga sažetaka  
1. simpozij Perović – Krmpotić Nemanić  
18. siječanj 2019., Zagreb



## **Znanstveni odbor**

prof.dr.sc. Zdravko Petanjek, dr.med.

prof.dr.sc. Vedran Katavić, dr.med.

prof.dr.sc. Nataša Kovačić, dr.med.

## **Organizacijski odbor**

Nikola Štoković, dr.med

Petra Čerina

Andrea Blažević

Natalia Ivanjko, mag.ing.biotech.



## PROGRAM

**9:00-9:15** Morfologija Von Economo neurona (Ivan Banovac, Dora Sedmak, Domagoj Džaja, Dubravko Jalšovec, Nataša Jovanov Milošević, Mladen Roko Rašin, Zdravko Petanjek)

**9:15-9:30** Mijeloidno-specifični molekularni posrednici subondralnog koštanog razaranja u mišjem modelu reumatoidnog artritisa (Nina Lukač, Alan Šućur, Darja Flegar, Tomislav Kelava, Katerina Zrinski Petrović, Vedran Katavić, Danka Grčević, Nataša Kovačić)

**9:30-9:45** Usporedba involucijskih promjena na gornjoj i donjoj čeljustim (Joško Bilandžić, Stela Hrkač, Nikola Štoković, Lovorka Grgurević)

**9:45-10:00** Frontoetmoidoorbitalna mukocela permagna kao kasna komplikacija celulitisa orbite (Petra Bistrović, Dora Bonacin, Marko Velimir Grgić)

**10:00-10:15** Utjecaj patologije srčanožilnog sustava na dimenzije velikih krvnih žila baze srca – usporedba s metodama slikovnog prikaza (Andrea Blažević, Goran Međimurec, Dubravko Jalšovec, Davor Mayer)

**10:15-10:30** Analiza prevencije neishemijskih uzroka nagle srčane smrt (Andrea Blažević, Eugen Ciglencečki, Mislav Puljević, Davor Mayer)

**10:30-10:45** Razvoj strijatuma tijekom fetalnog i ranog postnatalnog razdoblja određivan volumetrijskom analizom (Andrea Blažević, Marina Raguž, Dora Sedmak, Domagoj Džaja, Milan Radoš, Ivica Kostović)

**10:45-11:00** Povezanost imunizacijskog protokola i doze sa sustavnim i subondralnim gubitkom kosti u tijeku artritisa potaknutog antigenom (Martina Fadljević, Igor Radanović, Nina Lukač, Nataša Kovačić)

**11:00-11:15** Postnatalni razvoj gornje čeljusti (Nikola Štoković, Stela Hrkač, Joško Bilandžić, Lovorka Grgurević)

**11:15-11:30** O radu Studentske sekcije za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Josip Jaman, Yannick Mudrovčić, Andrea Blažević, Domagoj Ivanković, Katarina Jelić, Paula Batur, Lucija Biličić)



## Mijeloidno-specifični molekularni posrednici subhondralnog koštanog razaranja u mišjem modelu reumatoidnog artritisa

Nina Lukač<sup>1,2</sup>, Alan Šućur<sup>1,3</sup>, Darja Flegar<sup>1,3</sup>, Tomislav Kelava<sup>1,3</sup>, Katerina Zrinski Petrović<sup>1</sup>,  
Vedran Katavić<sup>1,2</sup>, Danka Grčević<sup>1,3</sup>, Nataša Kovačić<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Laboratorij za molekularnu imunologiju, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

<sup>2</sup>Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

<sup>3</sup>Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

**Uvod:** Reumatoidni artritis (RA) je kronična autoimunosna zglobna upala praćena razaranjem subhondralne kosti i postupnim razvojem invalidnosti. Usprkos širokoj primjeni modificirajućih i bioloških lijekova, terapijsko djelovanje na koštano oštećenje još uvijek je ograničeno. U mišjem modelu RA, artritisu potaknutom antigenom (AIA), potvrdili smo ublažavanje tijeka artritisa i izostanak koštanog razaranja u miševa bez funkcionalnog receptora Fas (Fas <sup>-/-</sup>), uz smanjeno nakupljanje mijeloidnih stanica u sinovijalnom prostoru. S ciljem utvrđivanja molekularnih posrednika koštanog razaranja analizirali smo razlike u izražaju gena u izdvojenoj sinovijalnoj mijeloidnoj populaciji miševa divljeg tipa (WT) i miševa Fas <sup>-/</sup> s artritismom.

**Materijali i metode:** AIA je izazvan intra-zglobnom injekcijom metiliranog goveđeg serumskog albumina (mBSA) u prethodno imuniziranih miševa. Koštana resorpcija procijenjena je pomoću mikro-kompjuterizirane tomografije ( $\mu$ CT). Sinovijalne stanice oslobođene su pomoću kolagenaze te obilježene anti-mišjim protutijelima CD45-FITC, CD11b-PE, Gr1-PECy7, B220/CD3/NK1.1/CD31/TER119-APC i CD51-APCeF780. Mijeloidna (CD11b+Gr-1+) populacija izdvojena je pomoću uređaja BD FACS Aria, izolirana je RNA te hibridizirana na genski čip Mouse ST 2.0 (Affymetrix), a podaci su analizirani pomoću sučelja Bioconductor u programu R. Razlike u genskom izražaju potvrđene su postupkom kvantitativne lančane reakcije polimeraze (qRT-PCR).

**Rezultati:** Sinovijalne mijeloidne stanice miševa Fas<sup>-/-</sup> i WT s artritismom imaju sličan transkripcijski profil, a hijerarhijski se grupiraju u dvije skupine s dominantno zastupljenim Fas<sup>-/-</sup> ili WT uzorcima. WT-dominantna skupina pojačano izražava gene vezane uz napredovanje staničnog ciklusa i mitozu, što upućuje na veću proliferativnu aktivnost. U miševa Fas<sup>-/-</sup> s artritismom smanjen je izražaj gena *Mid1* i *Erdr1*. Preliminarni rezultati pokazuju da primjena metformina *in vivo* (1g/kg, svakodnevno per os), koji inhibira aktivnost *Mid1*, ublažava upalu u miševa WT-AIA.

**Zaključci:** Resorptivni AIA karakterizira intenzivnija proliferacija sinovijalnih mijeloidnih stanica praćena pojačanim izražajem gena *Mid1*. Uloga *Mid1* već je opisana u patogenezi alergijske upale dišnog sustava te ovisi o smrtonosnom receptoru TRAIL, a preliminarni rezultati upućuju na potencijalno terapijsko značenje ove bjelančevine u artritisu.